

# CALENDRIER VACCINAL 2010

| Age        | Vaccins          |   |                       |                                |                          |                       |                          |   |  |                     |
|------------|------------------|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---|--|---------------------|
|            | BCG              | Diphtérie<br>Tétanos<br>Poliomyélite <sup>1</sup> | Coqueluche            | Hib                            | Hépatite B               | Pneumocoque           | Méningocoque<br>C        | Rougeole<br>Rubéole<br>Oreillons              | Papillomavirus<br>humain   | Grippe              |
| Naissance  | BCG <sup>2</sup> |   |                       |                                | Hep B <sup>3</sup>       |                       |                          |   |  |                     |
| 2 mois     |                  | DTPolio   | Ca <sup>4</sup>       | Hib                            | Hep B <sup>5</sup>       | Pn conj <sup>6</sup>  |                          |   |  |                     |
| 3 mois     |                  | DTPolio   | Ca <sup>4</sup>       | Hib                            |                          |                       |                          |   |  |                     |
| 4 mois     |                  | DTPolio   | Ca <sup>4</sup>       | Hib                            | Hep B <sup>5</sup>       | Pn conj <sup>6</sup>  |                          |   |  |                     |
| 9 mois     |                  |   |                       |                                |                          |                       |                          | Rougeole<br>rubéole<br>oreillons <sup>7</sup> |  | Grippe <sup>9</sup> |
| 12 mois    |                  |   |                       |                                |                          | Pn conj <sup>6</sup>  | Meningo C <sup>25</sup>  | Rougeole<br>rubéole<br>oreillons <sup>8</sup> |  |                     |
| 16-18 mois |                  | DTPolio   | Ca <sup>4</sup>       | Hib                            | Hep B <sup>5</sup>       |                       |                          |   |  |                     |
| 24 mois    |                  |   |                       |                                | Rattrapage <sup>11</sup> | Pn conj <sup>18</sup> | Rattrapage <sup>12</sup> | Rattrapage <sup>12</sup>                      |  |                     |
| < 6 ans    |                  |   |                       |                                |                          |                       |                          |   | Rattrapage <sup>26</sup><br>(1 dose<br>jusqu'à l'âge<br>de 24 ans) |                     |
| 6 ans      |                  | DTPolio <sup>10</sup>                             |                       |                                |                          |                       |                          |   |  |                     |
| 11-13 ans  |                  | DTPolio   | Ca <sup>4</sup>       |                                |                          |                       |                          |   |  |                     |
| 14 ans     |                  |   |                       |                                |                          |                       |                          |   |  |                     |
| 15 ans     |                  |   |                       |                                |                          |                       |                          | HPV <sup>22</sup>                             |  |                     |
| 16-18 ans  |                  |   | dTPolio <sup>14</sup> | ca <sup>16</sup><br>Rattrapage |                          | Pn 23 <sup>21</sup>   |                          | Rattrapage <sup>23</sup>                      |  |                     |
| 23 ans     |                  |   |                       |                                | Hep B <sup>24</sup>      |                       |                          | Rattrapage <sup>13</sup>                      |  |                     |
| 26-28 ans  |                  | dTPolio <sup>14, 15</sup>                         | ca <sup>17</sup>      |                                |                          |                       |                          |   |  |                     |
| > 28 ans   |                  | dTPolio <sup>14, 15</sup>                         |                       |                                |                          |                       |                          | Rubéole <sup>19</sup>                         |  |                     |
| > 65 ans   |                  |   |                       |                                |                          |                       |                          |   | Grippe <sup>20</sup>   |                     |

Lorsqu'un retard est intervenu dans la réalisation du calendrier de vaccinations indiqué, il n'est pas nécessaire de recommencer tout le programme des vaccinations imposant des injections répétées. Il suffit de reprendre ce programme au stade où il a été interrompu et de compléter la vaccination en réalisant le nombre d'injections requis en fonction de l'âge.

## LEGENDE DU TABLEAU

### - LES VACCINS INDICUES SUR FOND VERT EXISTENT SOUS FORME COMBINÉE :

- Diphtérie (titrage adulte), tétanos, polio.
- Diphtérie (titrage adulte), tétanos, polio, coquelucheux acellulaire.
- Diphtérie, tétanos, polio, plus coquelucheux acellulaire, Hib, hépatite B.
- Diphtérie, tétanos, polio, coquelucheux acellulaire.
- Diphtérie, tétanos, polio, plus coquelucheux acellulaire, Hib.

### - LES VACCINS INDICUES EN GRAS CORRESPONDENT AUX RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES ET LES VACCINS INDICUES EN ITALIQUE NE SONT PROPOSÉS QUE POUR DES RISQUES SPÉCIFIQUES.



1. Le vaccin poliomyélitique inactivé est le seul utilisé.
2. *Le BCG intradermique est fortement recommandé chez les enfants à risque élevé de tuberculose au plus tôt et si possible à la naissance ou au cours du 1<sup>er</sup> mois de vie. Chez les enfants à risque non vaccinés, la vaccination peut être réalisée jusqu'à l'âge de 15 ans.*
3. *A la naissance pour les enfants nés de mère Ag HBs positif : vaccination dans les 24 heures qui suivent la naissance et immunoglobulines anti-HBs administrées simultanément en des points différents. Deuxième et troisième doses respectivement à 1 et 6 mois d'âge. Schéma en 4 doses (0-1-2-6) pour les prématurés <32 semaines ou de moins de 2kg. L'efficacité de cette prévention doit être évaluée à partir de l'âge de 9 mois par une recherche d'antigène et anticorps anti-HBs, un à quatre mois après la dernière dose vaccinale.*
4. La vaccination est pratiquée avec le vaccin coquelucheux acellulaire (Ca).
5. La vaccination contre l'hépatite B est recommandée pour tous les enfants avant l'âge de 16 ans, en privilégiant la vaccination du nourrisson, avec un schéma complet en trois injections, les 2 premières à un ou deux mois d'intervalle, la troisième 5 à 12 mois après la date de la deuxième injection.
6. La vaccination par le vaccin pneumococcique conjugué 13-valent est recommandée pour tous les enfants en deux doses : à l'âge de 2 mois et 4 mois. Le rappel a lieu à l'âge de 12 mois. (Pour les prématurés et les nourrissons à haut risque, trois doses : à l'âge de 2 mois, 3 mois, 4 mois et rappel entre 12 et 15 mois).
7. *Pour les nourrissons entrant en collectivité avant 12 mois, il est recommandé d'administrer dès l'âge de 9 mois le vaccin rougeole-rubéole-oreillons. Dans ce cas, la 2<sup>e</sup> dose est recommandée entre 12 et 15 mois d'âge et suffit. Si le vaccin monovalent rougeoleux a été utilisé entre 6 et 8 mois, l'enfant devra recevoir 2 injections de vaccin trivalent à au moins un mois d'intervalle à partir de l'âge de 12 mois.*
8. La vaccination complète rougeole-rubéole-oreillons comprend 2 doses, la 1<sup>ère</sup> dose à l'âge de 12 mois, la 2<sup>ème</sup> dose au moins un mois après la 1<sup>ère</sup>, si possible avant l'âge de 24 mois.
9. *Enfants à partir de l'âge de 6 mois, adolescents et adultes, y compris les femmes enceintes, s'ils sont atteints de pathologies spécifiques. Pour l'entourage familial des nourrissons âgés de moins de 6 mois avec des facteurs de risque, pour les personnes séjournant dans un établissement de santé de moyen ou long séjour, quel que soit leur âge.*
10. En cas de pénurie de DTPolio, le vaccin contenant une dose réduite d'anatoxine diphtérique (dTPolio) peut être utilisé à partir de l'âge de 6 ans.
11. Si la vaccination contre l'hépatite B n'a pas été pratiquée, cette vaccination est recommandée jusqu'à l'âge de 15 ans révolus : a) Pour les enfants de 2 à 11 ans un schéma complet en 3 injections, les 2 premières à 1 mois d'intervalle, la 3<sup>ème</sup> cinq à douze mois après la date de la 2<sup>ème</sup> injection. b) Pour les adolescents de 11 à 15 ans révolus, en l'absence de risque élevé d'infection, un schéma en 2 doses : 0 et 6 mois avec les vaccins Engerix B 20 µg ou Genhevac B 20µg.
12. Deux doses de vaccin combiné triple rougeole-rubéole-oreillons à au moins un mois d'intervalle sont recommandées pour tous les enfants âgés de plus de 24 mois si pas de vaccin antérieur ; une dose si une seule dose vaccinale antérieure.
13. Une dose de vaccin trivalent rougeole-rubéole-oreillons pour les personnes âgées de 18 à 29 ans non vaccinées contre la rougeole.
14. A partir de l'âge de 16 ans, utiliser le vaccin diphtérique contenant une dose réduite d'anatoxine diphtérique (dTPolio).
15. A renouveler tous les 10 ans.
16. Vaccin dTcaPolio à partir de 16 ans pour les enfants qui n'ont pas reçu le rappel recommandé incluant la composante coquelucheuse à l'âge de 11-13 ans.(vaccin avec des doses réduites d'anatoxine diphtérique et d'antigènes coquelucheux).
17. Un rattrapage de la vaccination coqueluche par le vaccin dTcaPolio est recommandé chez l'adulte n'ayant pas reçu de vaccination contre la coqueluche au cours des 10 dernières années, notamment à l'occasion du rappel decennal d'TP de 26-28 ans. Pour certains professionnels de santé et de la petite enfance ainsi que les adultes ayant un projet parental dans les mois ou les années à venir, n'ayant pas reçu de vaccination coquelucheuse au cours des dix dernières années, un rappel est recommandé avec le vaccin dTcaPolio. Il n'y a pas lieu d'administrer plus d'une dose de vaccin dTcaPolio chez l'adulte.
18. *Pour les enfants à risque de 24 à 59 mois non préalablement vaccinés, la vaccination pneumococcique est recommandée selon le schéma suivant : 2 doses de vaccin conjugué Pn13 à 2 mois d'intervalle suivies d'une dose de vaccin polysidique 23-valent au moins 2 mois après la 2<sup>ème</sup> dose de vaccin conjugué.*
19. La vaccination rougeole-rubéole-oreillons est recommandée pour les femmes en âge de procréer non vaccinées (par ex : lors d'une visite de contraception ou pré-nuptiale). Si la sérologie prénatale est négative ou inconnue, la vaccination devra être pratiquée immédiatement après l'accouchement, de préférence avant la sortie de la maternité ou à défaut au plus tôt après la sortie.
20. Tous les ans.
21. *Chez l'enfant à partir de l'âge de 5 ans et l'adulte, la vaccination anti-pneumococcique avec le vaccin polysidique 23-valent (Pn 23) est recommandée, tous les 5 ans, pour les personnes à risque élevé d'infection à pneumocoque : asplénie fonctionnelle ou splénectomie, drépanocytose homozygote, syndrome néphrotique, insuffisance respiratoire, insuffisance cardiaque, personnes ayant des antécédents d'infection pulmonaire ou invasive à pneumocoque.*
22. La vaccination contre les infections à papillomavirus est recommandée à toutes les jeunes filles de 14 ans, afin de les protéger avant qu'elles ne soient exposées au risque d'infection à HPV.(schéma en 3 doses : 0, 1 et 6 mois ou 0, 2 et 6 mois selon le vaccin utilisé).
23. Un rattrapage du vaccin HPV est prévu chez les jeunes filles et jeunes femmes de 15 à 23 ans qui n'ont pas eu de rapports sexuels ou au cours de l'année qui suit le début de leur vie sexuelle. Cette mesure de rattrapage pourrait être proposée à l'occasion d'une prescription de contraception, ou lors d'une consultation pour tout autre motif.(le schéma en 3 doses : 0, 1 ou 2 mois, 6 mois selon le vaccin utilisé).
24. *Trois injections du vaccin hépatite B sont recommandées : les 2 premières à un mois d'intervalle, la troisième 5 à 12 mois après la date de la 2<sup>ème</sup> injection, pour les personnes à risque.*
25. Une injection du vaccin méningocoque monovalent C entre l'âge de 1 et 2 ans.
26. *Le vaccin méningocoque C (une dose) est recommandé en rattrapage jusqu'à l'âge de 24 ans révolus ainsi que pour les sujets contact non vaccinés.*